

DATI PROGRAM JE ORJENTACIONI. **PRATITI IZVEŠTAVANJA PIS** (PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE)!


BOLESTI I ŠTETOČINE	MART	APRIL	MAJ	JUN	JUL	AVGUST
RUPIČAVOST LIŠČA						
MONILIOZA						
RĐA + PLAMENJAČA						
ŠLJIVIN SMOTAVAC						
ŠLJIVINA OSA						
LISNE VAŠI						
PREGLJI						
CRVLJIVOST (2 generacije), SMOTAVAC (2 generacije)						



1) Mirovanje
Plavi preparati
Mineralno ulje
00-03




**4) Cvetanje /
precvetavanje**
Kingbo AS 0,2%
Aposthole 0,2%
59-69




**7) Tehnološki zreo plod
berba**
Perperin 0,15-0,2%
Chitosan 0,2%


2) Razvoj lista
Kingbo AS 0,2%
Chitosan 0,2%
10-19



5) Razvoj ploda
Kingbo AS 0,2%
Vegard AS 0,2-0,4%
69-77



3) Početak cvetanja
Aposthole 0,2%
Kingbo AS 0,2%
51-59



6) Sazrevanje ploda
Kingbo AS 0,2%
Aposthole 0,2%
81-85

SREDSTVA U PROGRAMU IMAJU PREVENTIVNO DEJSTVO, TREBA IH KORISTITI PRI POJAVI PRVIH SIMPTOMA.

NAPOMENA: OBAVEZNO PREVENTIVNO TRETIRANJE U FAZI ZRENJA NA SVAKIH 5-7 DANA KINGBO-m (DROZOPHILA SUZUKII). CHITOSAN / VEGARD U SLUČAJU POJAVE INFEKCIJE 0,3-0,4%