

# BOROVNICA

Vreme zaštite	Razlog tretiranja/ bolest	preparat	doza/koncentracija primene
<b>Kretanje vegetacije bubrenje pupoljaka</b>	Prezimljujuće forme lisnih i štitastih vaši, Grinje	Kingbo AS	0,2%
	Crveni pregalj Bolesti izdanaka	Chitosan	0,2-0,4%
<b>Listanje</b>	Plamenjača	Vegard AS	0,2-0,4%
<b>Pred cvetanje</b>	Monilioza cveta Siva trulež Pepelnica	Chitosan	0,2-0,4%
	Lisne vaši Cvetojed	Kingbo AS	0,2%
<b>Pojava cvetnih pupoljaka</b>	Bolesti izdanaka Lisne vaši Rutava buba	Aposthole, Kingbo AS	0,2%
<b>Cvetanje</b>	Bolesti stabla Monilioza cveta	Vegard AS	0,2-0,4%
<b>U punom cvetu</b>	Siva trulež Monilioza Sušenje lastara	po potrebi Chitosan	0,2-0,4%
<b>Pred početak zrenja</b>	Siva trulež	Perperin	0,2%
	Monilioza ploda	Chitosan	0,2%
	Drosophilla suzukii	Kingbo AS	0,2%
<b>7 dana pred berbu</b>	Siva trulež Patogeni lista i izdanaka	Chitosan, Perperin	0,2%
	Drosophilla suzukii	Kingbo AS	0,2%
<b>Posle berbe</b>	Lisne vaši	Aposthole	0,2%
	Bolesti stabla i lista	Vegard AS	0,2-0,4%

Pratiti izveštavanja PIS (prognozno izveštajne službe) za lokalno područje !

**NAPOMENA: OBAVEZNO PREVENTIVNO TRETIRANJE U FAZI ZRENJA NA SVAKIH 5-7 DANA -DROZOPHILA SUZUKII.**